

Biologie Clinique (1/2) : bilans canins et félins – 2025 (tarifs € TTC Esprivet)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si GIE : _____ ☐ Facturer propriétaire ← E-mail et adresse complète impératifs si facturation propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 13,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 4,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang	☐ Selles	☐ Urine méthode de collecte : _____	☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____		Date d'envoi (si différente) : _____	
☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi			

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Bilans hémato-biochimiques


- ☐ **Bilan de santé canin :** 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 76,50
 NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, TSH, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan de santé félin :** 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 71,40
 NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan anémie canin ou félin :** 2 tubes de 1 ml min sang total EDTA 114,75
 NF, examen du frottis sanguin, test de Coombs direct, PCR X 3 [Ehrlichiose, Babésiose, Borréliose] ou [FeLV, FIV, Hémobart.]
- ☐ **Bilan hémostase de base** ☐ [complet]* 0.5 ml min sang total EDTA + 0.5 ml min plasma citraté 45,90 / 112,20*
 NF, temps de Quick (PT), temps de Céphaline activée (aPTT), fibrinogène, D-dimères, [facteur VIII, facteur IX, facteur de Von Willebrand]*
- ☐ **Bilan hépatique :** 1 ml min (T0 et T1) plasma hépariné ou sérum 53,55
 ALAT, PAL, GGT, ASAT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, urée, acides biliaires pré- et post-prandiaux, glucose
- ☐ **Bilan pancréatite :** 0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum 76,50
 NF, lipase pancréatique, ALAT, PAL, ASAT, GGT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, glucose, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻
- ☐ **Bilan diarrhée chronique canin ou félin :** 1 ml min plasma hépariné ou sérum + selles Félin (pas de TLI) : 81,60 Canin : 91,80
 SANG : ALAT, PAL, GGT, bilirubine totale, prot. totales, albumine, globulines, glucose, TLI-folate-B12, Na⁺, K⁺, Cl⁻ - SELLES : Parasito., Giardia + Crypto. (PCR)
- ☐ **Bilan rénal de base** ☐ [complet (+ urine en pot/tube stérile)]* 0.5 ml min plasma hépariné ou sérum 56,10 / 68,85*
 Urée, créatinine, SDMA, protéines totales, albumine, globulines, Ca, P, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, [URINE : Examen urinaire, RPCU]*
- ☐ **Bilan cardiaque :** 0.5 ml min sérum 51,00
 Troponine I et NT-proBNP

Bilans endocriniens

0.5 ml min de plasma ou sérum

- ☐ **Bilan thyroïdien canin :** 44,20
 T4 totale, TSH, cholestérol, triglycérides, ALAT, PAL, bilirubine totale
- ☐ **Bilan thyroïdien félin :** + urine 56,10
 T4 totale, ALAT, PAL, GGT, urée, créatinine, cytologie urinaire, RPCU
- ☐ **Bilan Cushing 1 (stimulation ACTH*) :** 40,80
 Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
 N.B. : Cushing iatrogène décelable
- ☐ **Bilan Cushing 2 (freinage dexaméthasone en IV, 0.01 mg/kg chien - 0.1 mg/kg chat) :** 52,70
 Cortisol X3 (T0, T1 - 4h, et T2 - 8h après dexaméthasone), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
 N.B. : test + sensible « de référence » et origine du Cushing explorable (hypophysaire vs surrénalien)
- ☐ **Bilan syndrome d'Addison (stimulation ACTH*) :** 44,20
 Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), urée, créatinine, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻
- ☐ **Bilan alopécie (stimulation ACTH*) :** 57,80
 T4 totale, TSH, cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH)
- ☐ **Bilan statut gonadique et contrôle stérilisation** (1 seule prise de sang réalisée à n'importe quel moment) : 72,25
 Male : Testostérone + AMH (hormone antimüllérienne) ; Femelle : Progestérone + AMH

- ☐ **Suivi traitement hypothyroïdie canine :** 32,30
 T4 totale X2 (T0 et T1 - 3 à 5 h après traitement)
- ☐ **Suivi traitement hyperthyroïdie féline :** 21,25
 T4 totale (3 à 5 h après traitement)
- ☐ **Suivi traitement Cushing (stimulation ACTH*) :** 32,30
 Cortisol X2 (T0 et T1 selon schéma)



*** Stimulation ACTH**
 Synacthène® (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
 < 10 kg : ½ ampoule ; > 10 kg : 1 ampoule
 Cosacthen® Dechra (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
 5 µg/kg soit 0,02 ml/kg

Biologie Clinique (2/2) : analyses individuelles canines et félines – 2025 (tarifs € TTC Esprivet)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafier svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si GIE : _____ ☐ Facturer propriétaire E-mail et adresse complète impératifs si facturation propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 13,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 4,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang ☐ Selles ☐ Urine méthode de collecte : _____ ☐ Autre : _____
 Date de prélèvement : _____ Date d'envoi (si différente) : _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Immuno-hématologie	Biochimie	Endocrinologie	
0.5 ml min sang total EDTA	0.5 ml min plasma hépariné ou sérum	0.5 ml min plasma hépariné ou sérum	
☐ Numération Formule18,70 ☐ Examen de frottis sanguin25,50 Joindre NF svp ☐ NF + Examen de FS34,00 ☐ Coombs direct35,70 ☐ Anticorps anti-nucléaires34,00 Sérum requis ☐ Facteurs rhumatoïdes25,50 Sérum requis ☐ Groupes sanguins32,30	☐ Ac. biliaires 1 X22,10 ☐ Ac. biliaires 2 X34,00 AGPα1-Acid-Glycoprotein (chat)33,15 ☐ Albumine5,10 ☐ ALAT5,10 ☐ Ammonium12,75 ☐ ASAT5,10 ☐ Amylase7,65 ☐ Bilirubine totale5,10 ☐ Calcium/Phosphore10,20 ☐ Cholestérol5,10 ☐ CK5,10 CPSE30,60 Marqueur hyperplasie prostatique ☐ Créatinine5,10 ▶ Électroph. protéines29,75 Sérum requis - Leishmaniose :☐ Diagnostic☐ Suivi - PIF :☐ Diagnostic☐ Suivi - Autre :☐ ☐ Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻17,85 ☐ Fer17,85 ▶ Fructosamine19,55 ☐ Diagnostic☐ Suivi traitement	☐ GGT5,10 ☐ Glucose5,10 ☐ LDH5,10 ☐ Lipase pancréatique27,20 ☐ Magnésium5,10 NT-proBNP30,60 Sérum requis ☐ PAL5,10 ☐ Protéines totales5,10 Prot. C Réactive (chien)25,50 ☐ RPCU12,75 SAA Serum Amyloid A (chat)33,15 ☐ SDMA32,30 ☐ Triglycérides5,10 Troponine I30,60 ☐ Urée5,10	☐ Aldostérone60,00 AMH Hormone antimüllérienne68,00 ▶ Cortisol 1X21,25 ☐ Diag Cushing☐ Suivi Cushing☐ Diag Addison ▶ Cortisol 2X32,30 ☐ Diag Cushing☐ Suivi Cushing☐ Diag Addison ☐ Cortisol 3X (freination)45,05 ☐ Folate☐ B1228,90 ☐ Folate + B1237,40 ☐ Folate + B12 + TLI canine49,30 1 ml min plasma hépariné ou sérum ☐ Insuline33,15 IGF-160,00 ☐ Œstradiol33,15 ☐ Progestérone33,15 RCCU (cort./créat. urinaire)27,20 ☐ Testostérone33,15 TLI canine30,60 ▶ T4 totale21,25 ☐ Diagnostic hypo/hyperT4☐ Suivi traitement ▶ TSH canine30,60 ☐ Diagnostic hypoT4☐ Suivi traitement ▶ T4 totale + TSH canine40,80 ☐ Diagnostic hypoT4☐ Suivi traitement ▶ T4 libre21,25 ☐ Diagnostic hypo/hyperT4☐ Suivi traitement
Hémostase			
0.5 ml min plasma citraté			
☐ Tps de Quick (PT)15,30 ☐ Tps de Céph. Activée (aPTT)15,30 ☐ Fibrinogène12,75 D-dimères (ex. CVID, thrombose)15,30 ☐ Facteur VIII30,60 ☐ Facteur IX30,60 ☐ Facteur de Von Willebrand30,60			
Génétique/oncologie			
0.5 ml min sang total EDTA			
☐ Carcinome vésical mutation BRAF85,00 Urine requise (chien seulement) ☐ Myélopathie dégénérative75,00 ☐ Sensibilité médicamenteuse MDR175,00 ☐ Polykystose rénale75,00			

Hémostase

0.5 ml min plasma citraté

- ☐ Tps de Quick (PT) **15,30**
☐ Tps de Céph. Activée (aPTT) **15,30**
☐ Fibrinogène **12,75**
☐ D-dimères (*ex. CIVD, thrombose*) **15,30**
☐ Facteur VIII **30,60**
☐ Facteur IX **30,60**
☐ Facteur de Von Willebrand **30,60**

Génétique/oncologie

0.5 ml min sang total EDTA

- ☐ Carcinome vésical mutation BRAF **85,00**
Urine requise (chien seulement)
☐ Myélopathie dégénérative **75,00**
☐ Sensibilité médicamenteuse MDRI **75,00**
☐ Polykystose rénale **75,00**

Urologie

3 ml minimum d'urine

- ☐ Microscopie + bactériologie (ECBU) **53,55** ☐ Microscopie seule (cristaux, cellules, bactéries, etc.) **33,15** ☐ Calcul urinaire **38,25**
☐ RPCU **12,75** ☐ RCCU **27,20** ☐ Carcinome vésical mutation BRAF (*chien seulement*) **85,00**

Médicaments

0.5 ml min plasma hépariné ou sérum

- ☐ Bromure - KBr (3-5 h après le TT) **33,15** ☐ Gardénil / phénobarbital (3-5 h après le TT) **33,15** ☐ Digoxine (8-12 h après le TT) **33,15**