

Biologie Clinique (1/2) : bilans canins et félins – 2025 (tarifs € TTC VPLUS)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail :	☐ Joint <i>Chèque à l'ordre de VETODIAG - agréer svp</i> ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire <i>Si GIE :</i> _____ ☐ Facturer propriétaire ← E-mail et adresse complète impératifs si facturation propriétaire <i>Chronopost / France Express / TCS : + 14,00</i> <i>Enveloppes postales préaffranchies : + 4,00</i> <i>Commande de matériel : www.vetodiag.fr</i>

Prélèvement transmis

☐ Sang	☐ Selles	☐ Urine <i>méthode de collecte :</i> _____	☐ Autre : _____
<u>Date de prélèvement :</u> _____		<u>Date d'envoi (si différente) :</u> _____	
☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi			

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :


Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Bilans hémato-biochimiques

- ☐ **Bilan de santé canin :** *0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum* 76,50
 NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, TSH, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan de santé félin :** *0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum* 71,40
 NF, urée, créatinine, SDMA, ALAT, GGT, PAL, bilirubine totale, lipase, protéines totales, albumine, cholestérol, fructosamine, T4 totale, Na⁺, K⁺, Cl⁻
- ☐ **Bilan anémie canin ou félin :** *2 tubes de 1 ml min sang total EDTA* 114,75
 NF, examen du frottis sanguin, test de Coombs direct, PCR X 3 [Ehrlichiose, Babésiose, Borréliose] ou [FeLV, FIV, Hémobart.]
- ☐ **Bilan hémostase de base** ☐ **[complet]*** *0.5 ml min sang total EDTA + 0.5 ml min plasma citraté* 45,90 / 112,20*
 NF, temps de Quick (PT), temps de Céphaline activée (aPTT), fibrinogène, D-dimères, [facteur VIII, facteur IX, facteur de Von Willebrand]*
- ☐ **Bilan hépatique :** *1 ml min (T0 et T1) plasma hépariné ou sérum* 53,55
 ALAT, PAL, GGT, ASAT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, urée, acides biliaires pré- et post-prandiaux, glucose
- ☐ **Bilan pancréatite :** *0.5 ml min sang total EDTA + 1 ml min plasma hépariné ou sérum* 76,50
 NF, lipase pancréatique, ALAT, PAL, ASAT, GGT, bilirubine totale, protéines totales, albumine, globulines, glucose, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻
- ☐ **Bilan diarrhée chronique canin ou félin :** *1 ml min plasma hépariné ou sérum + selles* *Félin (pas de TLI) : 81,60 Canin : 91,80*
 SANG : ALAT, PAL, GGT, bilirubine totale, prot. totales, albumine, globulines, glucose, TLI-folate-B12, Na⁺, K⁺, Cl⁻ - SELLES : Parasito., Giardia + Crypto. (PCR)
- ☐ **Bilan rénal de base** ☐ **[complet (+ urine en pot/tube stérile)]*** *0.5 ml min plasma hépariné ou sérum* 56,10 / 68,85*
 Urée, créatinine, SDMA, protéines totales, albumine, globulines, Ca, P, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻, [URINE : Examen urinaire, RPCU]*
- ☐ **Bilan cardiaque :** *0.5 ml min sérum* 51,00
 Troponine I et NT-proBNP

Bilans endocriniens

0.5 ml min de plasma ou sérum

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☐ Bilan thyroïdien canin : 44,20
 T4 totale, TSH, cholestérol, triglycérides, ALAT, PAL, bilirubine totale ☐ Bilan thyroïdien félin : <i>+ urine</i> 56,10
 T4 totale, ALAT, PAL, GGT, urée, créatinine, cytologie urinaire, RPCU ☐ Bilan Cushing 1 (stimulation ACTH*) : 40,80
 Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
 <i>N.B. : Cushing iatrogène décelable</i> ☐ Bilan Cushing 2 (freinage dexaméthasone en IV, 0.01 mg/kg chien - 0.1 mg/kg chat) : 52,70
 Cortisol X3 (T0, T1 - 4h, et T2 - 8h après dexaméthasone), PAL, ALAT, GGT, bilirubine totale
 <i>N.B. : test + sensible « de référence » et origine du Cushing explorable (hypophysaire vs surrénalien)</i> ☐ Bilan syndrome d'Addison (stimulation ACTH*) : 44,20
 Cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH), urée, créatinine, Na⁺, K⁺, Cl⁻, HCO₃⁻ ☐ Bilan alopecie (stimulation ACTH*) : 57,80
 T4 totale, TSH, cortisol X2 (T0 et T1 - 1h30 après ACTH) ☐ Bilan statut gonadique et contrôle stérilisation (1 seule prise de sang réalisée à n'importe quel moment) : 72,25
 <i>Male :</i> Testostérone + AMH (hormone antimüllérienne) ; <i>Femelle :</i> Progestérone + AMH | <ul style="list-style-type: none"> ☐ Suivi traitement hypothyroïdie canine : 32,30
 T4 totale X2 (T0 et T1 - 3 à 5 h après traitement) ☐ Suivi traitement hyperthyroïdie féline : 21,25
 T4 totale (3 à 5 h après traitement) ☐ Suivi traitement Cushing (stimulation ACTH*) : 32,30 |
|---|--|
- 
- * Stimulation ACTH**
 Synacthène® (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
 < 10 kg : ½ ampoule ; > 10 kg : 1 ampoule
 Cosacthen® Dechra (0,25 mg dans 1 ml) [IM ou IV]
 5 µg/kg soit 0,02 ml/kg

Biologie Clinique (2/2) : analyses individuelles canines et félines – 2025 (tarifs € TTC VPLUS)

Vétérinaire	Patient	Propriétaire	Règlement
E-mail :	Nom : ☐ Chien ☐ Chat ☐ Autre : Race : Age : ☐ Mâle ☐ Femelle ☐ Stérilisé(e) ☐ Non stérilisé(e)	Nom : Adresse : E-mail :	☐ Joint Chèque à l'ordre de VETODIAG - agrafé svp ☐ Prépaiement par CB sur vetodiag.fr ☐ Facturer vétérinaire Si GIE : _____ ☐ Facturer propriétaire E-mail et adresse complète impératifs si facturation propriétaire Chronopost / France Express / TCS : + 14,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 4,00 Commande de matériel : www.vetodiag.fr

Prélèvement transmis

☐ Sang	☐ Selles	☐ Urine méthode de collecte : _____	☐ Autre : _____
Date de prélèvement : _____		Date d'envoi (si différente) : _____	
☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi			

Informations cliniques

Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) :

Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :

Immuno-hématologie <i>0.5 ml min sang total EDTA</i>	Biochimie <i>0.5 ml min plasma hépariné ou sérum</i>	Endocrinologie <i>0.5 ml min plasma hépariné ou sérum</i>
☐ Numération Formule 18,70 ☐ Examen de frottis sanguin 25,50 <i>Joindre NF svp</i> ☐ NF + Examen de FS 34,00 ☐ Coombs direct 35,70 ☐ Anticorps anti-nucléaires 34,00 <i>Sérum requis</i> ☐ Facteurs rhumatoïdes 25,50 <i>Sérum requis</i> ☐ Groupes sanguins 32,30	☐ Ac. biliaires 1 X 22,10 ☐ Ac. biliaires 2 X 34,00 ☐ AGP <i>α1-Acid-Glycoprotein (chat)</i> 33,15 ☐ Albumine 5,10 ☐ ALAT 5,10 ☐ Ammonium 12,75 ☐ ASAT 5,10 ☐ Amylase 7,65 ☐ Bilirubine totale 5,10 ☐ Calcium/Phosphore 10,20 ☐ Cholestérol 5,10 ☐ CK 5,10 ☐ CPSE 30,60 <i>Marqueur hyperplasie prostatique</i> ☐ Créatinine 5,10 ☐ Électroph. protéines 29,75 <i>Sérum requis</i> - Leishmaniose : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - PIF : ☐ Diagnostic ☐ Suivi - Autre : ☐ _____ ☐ Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ , HCO ₃ ⁻ 17,85 ☐ Fer 17,85 ☐ Fructosamine 19,55 ☐ Diagnostic ☐ Suivi traitement	☐ Aldostérone 60,00 ☐ AMH <i>Hormone antimüllérienne</i> 68,00 ☐ Cortisol 1X 21,25 ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison ☐ Cortisol 2X 32,30 ☐ Diag Cushing ☐ Suivi Cushing ☐ Diag Addison ☐ Cortisol 3X (freination) 45,05 ☐ Folate ☐ B12 28,90 ☐ Folate + B12 37,40 ☐ Folate + B12 + TLI <i>canine</i> 49,30 <i>1 ml min plasma hépariné ou sérum</i> ☐ Insuline 33,15 ☐ IGF-1 60,00 ☐ Œstradiol 33,15 ☐ Progestérone 33,15 ☐ RCCU (cort./créat. urinaire) 27,20 ☐ Testostérone 33,15 ☐ TLI <i>canine</i> 30,60 ☐ T4 totale 21,25 ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement ☐ TSH canine 30,60 ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement ☐ T4 totale + TSH canine 40,80 ☐ Diagnostic hypoT4 ☐ Suivi traitement ☐ T4 libre 21,25 ☐ Diagnostic hypo/hyperT4 ☐ Suivi traitement

Hémostase

0.5 ml min plasma citraté

- | | |
|---|--------------|
| ☐ Tps de Quick (PT) | 15,30 |
| ☐ Tps de Céph. Activée (aPTT) | 15,30 |
| ☐ Fibrinogène | 12,75 |
| ☐ D-dimères (<i>ex. CIVD, thrombose</i>) | 15,30 |
| ☐ Facteur VIII | 30,60 |
| ☐ Facteur IX | 30,60 |
| ☐ Facteur de Von Willebrand | 30,60 |

Génétique/oncologie

0.5 ml min sang total EDTA

- | | |
|--|--------------|
| ☐ Carcinome vésical mutation BRAF | 85,00 |
| <i>Urine requise (chien seulement)</i> | |
| ☐ Myélopathie dégénérative | 75,00 |
| ☐ Sensibilité médicamenteuse MDRI | 75,00 |
| ☐ Polykystose rénale | 75,00 |

Urologie

3 ml minimum d'urine

- | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|---|--------------|
| ☐ Microscopie + bactériologie (ECBU) | 53,55 | ☐ Microscopie seule (cristaux, cellules, bactéries, etc.) | 33,15 | ☐ Calcul urinaire | 38,25 |
| ☐ RPCU | 0,00 | ☐ RCCU | 27,20 | ☐ Carcinome vésical mutation BRAF (<i>chien seulement</i>) | 85,00 |

Médicaments

0.5 ml min plasma hépariné ou sérum

- | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| ☐ Bromure - KBr (3-5 h après le TT) | 33,15 | ☐ Gardéna / phénobarbital (3-5 h après le TT) | 33,15 | ☐ Digoxine (8-12 h après le TT) | 33,15 |
|--|--------------|--|--------------|--|--------------|