

Infectiologie équine (1/2) : bilans – 2025 (tarifs € TTC argos)

Vétérinaire Cachet et signature	Patient	Propriétaire	Détenteur (si différent du propriétaire)
		Facturation : e-mail et adresse complète obligatoires	Facturation : e-mail et adresse complète obligatoires
	Nom :	Nom :	Nom :
	Age : Sexe :	Adresse :	Adresse :
	Race :		
E-mail :	Stationnement de l'équidé (code postal ou département) :	E-mail :	E-mail :
		N° tel :	N° tel :
Modalités de règlement ☐ Joint (chèque à l'ordre de VETODIAG) ☐ Prépaiement par CB (vetodiag.fr) ☐ Facturer vétérinaire (Si GIE : _____) ☐ Facturer propriétaire ☐ Facturer détenteur ⚠ Facturation propriétaire ou détenteur : e-mail et adresse complète obligatoires			
Prélèvement transmis ☐ Sang total ☐ Plasma (entourer sup : EDTA / hépariné / citraté) ☐ Sérum ☐ LT ☐ LBA ☐ Selles ☐ Autre : _____ Date de prélèvement : _____ Date d'envoi (si différente) : _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi			
Informations cliniques Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) : _____ Hypothèses diagnostiques et traitements reçus : _____			
Informations complémentaires pour les prélèvements respiratoires 1. <u>Clinique</u> : ☐ Toux ☐ Détresse resp. ☐ Intolérance à l'effort ☐ Hyperthermie ☐ Épistaxis/sang trachéal ☐ Jetage ☐ Mucus trachéal (_ /5) 2. <u>Lavage(s)</u> Technique : LBA _____ LT _____ Volume instillée : LBA _____ LT _____ Prélèvement au repos ☐ après effort ☐ (_ h)			
Bilans respiratoires Maintenir si possible les prélèvements pour la bactériologie et la PCR entre 2 et 8°C jusqu'à l'envoi des analyses			
☐ Bilan respiratoire de base équin : 113,90 <u>LT (tubes EDTA et sec)</u> : cytologie, bactériologie, mycologie <u>LBA (tubes EDTA)</u> : cytologie		PCR complémentaire(s) : ☐ <i>Mycoplasma sp.</i> (LT/LBA, ENP, poumon) ☐ <i>Streptococcus equi equi</i> (gourme) (Lavage PG, ENP, pus) ☐ <i>Rhodococcus equi</i> (LT, pus, selles)	
☐ Bilan respiratoire contre-performance : 170,00 <u>LT (tubes EDTA et sec)</u> : cytologie, bactériologie, mycologie, PCR [Herpesvirus II-V] <u>LBA (tubes EDTA)</u> : cytologie			
☐ Bilan respiratoire complet équin : 259,25 <u>LT (tubes EDTA et sec) + écouv. nasopharyngé</u> : cytologie, bactériologie, mycologie, PCR [Herpesvirus I-II-IV-V, Influenza, Rhinovirus A et B, Mycoplasma sp.] <u>LBA (tubes EDTA)</u> : cytologie			
☐ Bilan « nouvel entrant » : 93,50 ☐ Coproscopie + 21,25 <u>Écouvillon nasopharyngé (+ idéalement lavage de poche gutturale)</u> : PCR [Herpesvirus I, Herpesvirus IV, Influenza, Gourme]			
Bilans digestifs Maintenir si possible les prélèvements pour la bactériologie, la coprologie et la PCR entre 2 et 8°C jusqu'à l'envoi des analyses			
☐ Bilan diarrhée nouveau-né (0 - 1 mois) : 170,00 <u>Selles requises</u> : Bactériologie, PCR [Salmonella, Rotavirus], Cryptosporidium, Clostridioides perfringens-entérotoxine, Clostridioides difficile-toxine A/B			
☐ Bilan diarrhée poulain (1 - 6 mois) : 210,80 ☐ + PCR <i>Rhodococcus equi</i> + 17,85 <u>Selles requises</u> : Bactériologie, copro., PCR [Salmonella, Lawsonia, Rotavirus, Coronavirus], Cryptosporidium, C. perfringens-entérotoxine, C. difficile-toxine A/B			
☐ Bilan diarrhée cheval adulte : 170,00 <u>Selles requises</u> : Bactériologie, coproscopie, PCR [Salmonella, Coronavirus], Clostridioides perfringens-entérotoxine, Clostridioides difficile-toxine A/B			
Bilans « piro-like » Maintenir si possible les prélèvements entre 2 et 8°C jusqu'à l'envoi des analyses (sérum pour la sérologie – sang total EDTA pour la PCR)			
☐ Bilan 5 sérologies : 131,75 ou ☐ Bilan 5 PCR : 119,85 Anaplasmose, Borréliose*, Piroplasmose (B. caballi et T. equi.), Leptospirose		☐ Bilan « mixte » 1 : 131,75 PCR : Anaplasmose, Piroplasmose <u>Sérologie</u> : Borréliose*, Leptospirose	
☐ Bilan 4 sérologies : 106,25 ou ☐ Bilan 4 PCR : 102,00 Anaplasmose, Borréliose*, Piroplasmose (B. caballi et T. equi.)		☐ Bilan « mixte » 2 : 131,75 PCR : Piroplasmose <u>Sérologie</u> : Anaplasmose, Borréliose*, Leptospirose	
* Si sérologie Borrelia ELISA positive : confirmation immunoblot : ajouter 33,15			
Bilans infertilité - interruption de gestation - mortalité néonatale Maintenir si possible les prélèvements pour la bactériologie et la PCR entre 2 et 8°C jusqu'à l'envoi des analyses			
☐ Bilan interruption de gestation équin : 221,00 PCR _{X4} : [EHV-1, EHV-4, Leptospira, EAV], bactériologie, histopathologie Analyses sur organes fœtaux et échantillons placentaires : nous contacter		☐ Bilan mortalité néonatale équin : 203,15 PCR _{X3} : [EHV-1, Leptospira, EAV], bactériologie, histopathologie Analyses sur organes fœtaux : nous contacter	
☐ Bilan infertilité jument : 127,50 Merci de préciser : 1. le stade du cycle oestral : _____ 2. Nombre d'années d'infertilité : _____ <u>Lavage utérin (tubes EDTA et sec)</u> : cytologie, bactériologie <u>Biopsies endométriales (formol)</u> : histopathologie			