

Infectiologie équine (1/2) : bilans – 2026 (tarifs € TTC Vetoalliance)

Vétérinaire Cachet et signature	Patient	Propriétaire	Détenteur (si différent du propriétaire)
		Si facturation : coordonnées complètes obligatoires	Si facturation : coordonnées complètes obligatoires
	Nom :	Nom :	Nom :
	Age : Sexe :	Adresse :	Adresse :
	Race :	Facturation électronique obligatoire en 2026	Facturation électronique obligatoire en 2026
E-mail :	Stationnement de l'équidé : (code postal ou département)	E-mail :	E-mail :
		N° tel :	N° tel :
Modalités de règlement ☐ Joint (chèque à l'ordre de VETODIAG) ☐ Prépaiement par CB (vetodiag.fr) ☐ Facturer vétérinaire (Si GIE : _____) ☐ Facturer propriétaire ☐ Facturer détenteur Facturation propriétaire ou détenteur : e-mail et adresse complète obligatoires Envoi Chronopost / France Express : + 15,00 Enveloppes postales préaffranchies : + 5,00			
Prélèvement transmis ☐ Sang total ☐ Plasma (entourer sup : EDTA / hépariné / citraté) ☐ Sérum ☐ LT ☐ LBA ☐ Selles ☐ Autre : _____ Date de prélèvement : _____ Date d'envoi (si différente) : _____ ☐ réfrigéré ☐ congelé avant envoi			
Informations cliniques Commémoratifs (n'hésitez pas à joindre les résultats des examens complémentaires réalisés) : Hypothèses diagnostiques et traitements reçus :			
Informations complémentaires pour les prélèvements respiratoires 1. Clinique : ☐ Toux ☐ Détresse resp. ☐ Intolérance à l'effort ☐ Hyperthermie ☐ Épistaxis/sang trachéal ☐ Jetage ☐ Mucus trachéal (__ /5) 2. Lavage(s) : Technique : LBA _____ LT _____ Volume instillée : LBA _____ LT _____ Prélèvement au repos ☐ après effort ☐ (__ h)			
Bilans respiratoires Maintenir si possible les prélèvements pour la bactériologie et la PCR entre 2 et 8°C jusqu'à l'envoi des analyses			
☐ Bilan respiratoire de base équin : 113,90 LT (tubes EDTA et sec) : cytologie, bactériologie, mycologie LBA (tubes EDTA) : cytologie ☐ Bilan respiratoire contre-performance : 170,00 LT (tubes EDTA et sec) : cytologie, bactériologie, mycologie, PCR [Herpesvirus II-V] LBA (tubes EDTA) : cytologie ☐ Bilan respiratoire complet équin : 259,25 LT (tubes EDTA et sec) + écouv. nasopharyngé : cytologie, bactériologie, mycologie, PCR [Herpesvirus I-II-IV-V, Influenza, Rhinovirus A et B, Mycoplasma sp.] LBA (tubes EDTA) : cytologie ☐ Bilan « nouvel entrant » : 93,50 ☐ Coproscopie + 21,25 Ecouvillon nasopharyngé (+ idéalement lavage de poche gutturale) : PCR [Herpesvirus I, Herpesvirus IV, Influenza, Gourme]		PCR complémentaire(s) : ☐ Mycoplasma sp. (LT/LBA, ENP, poumon) ☐ Streptococcus equi equi (gourme) (Lavage PG, ENP, pus) ☐ Rhodococcus equi (LT, pus, selles)	
Bilans digestifs Maintenir si possible les prélèvements pour la bactériologie, la coprologie et la PCR entre 2 et 8°C jusqu'à l'envoi des analyses			
☐ Bilan diarrhée nouveau-né (0 - 1 mois) : 170,00 Selles requises : Bactériologie, PCR [Salmonella, Rotavirus], Cryptosporidium, Clostridioides perfringens-entérotoxine, Clostridioides difficile-toxine A/B ☐ Bilan diarrhée poulain (1 - 6 mois) : 210,80 ☐ * PCR Rhodococcus equi + 17,85 Selles requises : Bactériologie, copro., PCR [Salmonella, Lawsonia, Rotavirus, Coronavirus], Cryptosporidium, C. perfringens-entérotoxine, C. difficile-toxine A/B ☐ Bilan diarrhée cheval adulte : 170,00 Selles requises : Bactériologie, coproscopie, PCR [Salmonella, Coronavirus], Clostridioides perfringens-entérotoxine, Clostridioides difficile-toxine A/B			
Bilans « piro-like » Maintenir si possible les prélèvements entre 2 et 8°C jusqu'à l'envoi des analyses (sérum pour la sérologie – sang total EDTA pour la PCR)			
☐ Bilan 5 sérologies : 131,75 ou ☐ Bilan 5 PCR : 119,85 Anaplasmose, Borrelie*, Piroplasmose (B. caballi et T. equi.), Leptospirose ☐ Bilan 4 sérologies : 106,25 ou ☐ Bilan 4 PCR : 102,00 Anaplasmose, Borrelie*, Piroplasmose (B. caballi et T. equi.) * Si sérologie Borrelia ELISA positive : confirmation immunoblot : ajouter 33,15		☐ Bilan « mixte » 1 : 131,75 PCR : Anaplasmose, Piroplasmose Sérologie : Borrelie*, Leptospirose ☐ Bilan « mixte » 2 : 131,75 PCR : Piroplasmose Sérologie : Anaplasmose, Borrelie*, Leptospirose	
Bilans infertilité - interruption de gestation - mortalité néonatale Maintenir si possible les prélèvements pour la bactériologie et la PCR entre 2 et 8°C jusqu'à l'envoi des analyses			
☐ Bilan interruption de gestation équin : 221,00 PCRX4 : [EHV-1, EHV-4, Leptospira, EAV], bactériologie, histopathologie Analyses sur organes fœtaux et échantillons placentaires : nous contacter ☐ Bilan infertilité jument : 127,50 Merci de préciser : 1. le stade du cycle œstral : _____ 2. Nombre d'années d'infertilité : _____ Lavage utérin (tubes EDTA et sec) : cytologie, bactériologie Biopsies endométriales (formol) : histopathologie		☐ Bilan mortalité néonatale équin : 203,15 PCRX3 : [EHV-1, Leptospira, EAV], bactériologie, histopathologie Analyses sur organes fœtaux : nous contacter	